

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGIO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 179
du
16 Août 1990

VIGNE

**** Tordeuses de la grappe**

Les captures de papillons sont toujours en augmentation et les dépôts de ponte abondants sur BRAVONE, LINGUIZZETTA, ALERIA et GHISONACCIA.

--> Si le traitement préventif a déjà été réalisé, intervenez en curatif si le seuil de 10 chenilles pour 100 grappes est atteint.

--> Si aucun traitement n'a été fait, préférez une spécialité à action préventive et curative BAYTHROID, MAXI CAP, ULTRACIDE 20, SUPRATHION, LANNATE 20 L, METOVER, LARVIN, RHODIATOX ACARICIDE, et spécialités à base de parathion.

:	:
:	:
:	En présence de cicadelles :
:	vertes, préférez BAYTHROID, :
:	LANNATE 20 L, METOVER :
:	:

:	:
:	:
:	En présence de cochenilles, :
:	préférez ULTRACIDE 20 :
:	SUPRATHION :
:	:

**** Mildiou, Oïdium**

Ne traitez plus, les cépages les plus tardifs ont atteint la veraison.

**** Acariens jaunes et rouges**

. Contrôler le seuil de 40 % de feuilles occupées avant toute intervention.

. Délai d'emploi des acaricides avant récolte

TORERO, VIKTOR, APOLLO, TORANT = 42 jours
Spécialités à base de cyhexalione, PEROPAL = 30 jours
DANITOL, OMITE 57 EL, CESAR, ACARYL PRO = 21 jours
TORQUE S = 3 jours
TALSTAR = sans délai.

AGRUMES

Effectuez dès la semaine prochaine un traitement généralisé dans vos vergers. Destiné à lutter contre les aleurodes, larves de cochenilles, acariens et pucerons, ce traitement sera à base d'un insecticide additionné de 1 % d'huile blanche d'été.

La bouillie sera très copieuse 2000 à 2500 l /ha.

OLIVIERS

Dans tous les postes de piègeages, BORGIO, QUERCIOLO, SANTO PIETRO DI TENDA, LOPIGNA, SARI D'ORCINO, SAINTE LUCIE DE TALLANO, SOLLACARO, le niveau de captures dépasse largement le seuil.

Les vols sont exceptionnels, ils ont débuté de bonne heure, les populations sont abondantes et le nombre de fruits piqués est déjà important.

En conséquence une lutte **curative** en toutes zones s'impose dès maintenant.

Produits utilisables

:	:	:	:
: MATIERE ACTIVE	: DOSE g M.A/hl	: PRODUIT COMMERCIAL	:
:	:	:	:
: dimethoate	: 30	: NBS SPECIALITE	:
: formothion	: 40	: ANTHIO FORT	:
: phosphamidon	: 30	: DIMECRON	:
: diazinon	: 30	: BASUDINE, KNOX-OUT	:
: ou fenitrothion	: 55	: LEBAYCID	:
:	:	:	:

Délai d'emploi 21 jours avant récolte pour tous ces insecticides

PECHERS

**** Mouche méditerranéenne**

Surveillez vos parcelles. Les captures deviennent très élevées dans certains vergers de pêcheurs et nectariniers. Intervenez à l'approche de la maturité.

=====